

DIGA NÃO AO CANCRO DO COLO DO ÚTERO

Em Portugal, morrem anual-
mente 200 mulheres com
CANCRO DO COLO DO
ÚTERO

Se tem entre 25 e 64 anos,
FAÇA O RASTREIO!

Marque consulta com o seu
Médico de Família



USF ANDREAS



FOLHETO INFORMATIVO

Rastreio do cancro do colo



Rua Dr. Domingos Machado Pereira
2640-475 MAFRA
Telefone Geral: 261818100
Fax: 261814853

R. das Figueiras nº 4 Livramento
2665 015 AZUEIRA
Telf.: 261 961 368
Fax.: 261 962138

Mail: usf.andreas@csmafra.min.saude-pt

Agosto 2015
Revisão Anual

Rastreamento do cancro do colo do útero

O que é o cancro do colo do útero?

O cancro do colo do útero desenvolve-se no colo, que é a extremidade inferior do útero que liga o corpo do útero à vagina.

Ocorre quando as células do colo do útero desenvolvem anomalias e começam a crescer de forma descontrolada.

Porque motivo devo fazer o rastreio?

O rastreio do cancro do colo do útero foi concebido para detetar células do colo do útero anormais nas fases iniciais, altura em que podem ser facilmente removidas antes de evoluírem para cancro.

Quem deve fazer o rastreio?

Todas as mulheres com idades compreendidas entre os 25 e os 65 anos devem fazer o rastreio.

Inicialmente, o rastreio deve ser feito uma vez por ano.

Depois de ter dois resultados de exame de Papanicolau normais, deve fazer o rastreio de três em três anos.

Como funciona o rastreio?

O rastreio do colo do útero está atualmente a ser efetuado através do exame de Papanicolau.

Num exame curto e indolor, o médico colhe cuidadosamente uma amostra de células do seu colo do útero com uma pequena espátula ou escova.

Estas células são enviadas para o laboratório, onde são examinadas ao microscópio para detetar possíveis células anormais no colo do útero.

Resultado Normal no exame Papanicolau

A maior parte das mulheres apresenta resultados normais. Nesse caso, o risco de cancro do colo do útero é baixo, e deve continuar a efetuar o rastreio regularmente.

Resultado anormal no exame de Papanicolau

Algumas mulheres obtêm resultados anormais neste exame. Isso significa simplesmente que foram encontradas células anormais no colo do útero no exame Papanicolau.



Dependendo do resultado, será aconselhada a efetuar um dos seguintes procedimentos:

- Novo exame de Papanicolau dentro de 6 meses
- Um teste para identificação do Vírus do Papiloma Humano (HPV), que é o vírus que pode causar o cancro do colo do útero
- Uma colposcopia, que é um procedimento que permite ao médico examinar mais de perto o colo do útero.

Determinadas anomalias devem ser removidas para que não evoluam para cancro