



Como é inserido o implante?


A inserção do implante subcutâneo deve ser realizada apenas por um profissional de saúde qualificado que esteja familiarizado com o procedimento.



-Para facilitar a inserção do implante, deve deitar-se de costas com o seu braço ligeiramente curvado no cotovelo e rodado para fora (Fig.2).



-O implante será inserido no lado interno da parte superior do seu braço não dominante (Fig. 3 e 4).



-O local de inserção será marcado na pele e será desinfectado e anestesiado.

Em caso de dúvida consulte o seu médico de família!

Elaborado por:

Filipa Cardoso
Interna do 1º ano de Medicina Geral e Familiar

USF ANDREAS



FOLHETO INFORMATIVO

Rua Dr. Domingos Machado Pereira
2640-475 MAFRA
Telefone Geral: 261818100
Fax: 261814853

R. das Figueiras nº 4 Livramento
2665 015 AZUEIRA
Telf.: 261 961 368
Fax.: 261 962138

Mail: usf.andreas@csmafra.min.saude-pt

Método contraceutivo: Implante subcutâneo



Agosto 2015
Revisão Anual

Método contraceptivo: Implante Subcutâneo

O que é o Implante Subcutâneo e para que é utilizado?

O implante subcutâneo é um pequeno bastonete de plástico flexível e macio com 4 cm de comprimento e 2 mm de diâmetro, que contém 68 miligramas de substância ativa etonogestrel (Fig.1).



É um contraceptivo hormonal para ação prolongada, eficaz durante 3 anos e reversível. O etonogestrel é uma hormona feminina sintética similar à progesterona. Uma pequena quantidade de etonogestrel é libertada de forma contínua para a corrente sanguínea.

O Implante é utilizado para prevenir a gravidez.

Como atua o implante subcutâneo?

O implante é inserido mesmo por baixo da pele. O componente ativo, o etonogestrel, atua de duas formas:

- Previne a libertação de um óvulo dos ovários.
- Provoca alterações no colo do útero que vão dificultar a entrada dos espermatozoides no útero.

Assim, o implante vai protegê-la contra a gravidez por um período de três anos.

Ao utilizar o implante subcutâneo não tem de se lembrar de tomar uma pílula todos os dias. Esta é uma das razões para o implante ser muito eficaz (mais de 99 % de eficácia).

Quando estiver a usar o implante, a sua hemorragia menstrual pode sofrer alterações e tornar-se ausente, irregular, pouco frequente, frequente, prolongada ou raramente abundante. O padrão hemorrágico que irá ter durante os primeiros três meses indica geralmente o seu padrão hemorrágico futuro. As menstruações dolorosas poderão melhorar.

O que deve saber antes do implante subcutâneo ser inserido?

Os contraceptivos hormonais, incluindo o implante, NÃO protegem contra as infeções pelo VIH (SIDA) ou qualquer outra doença sexualmente transmissível.

Não utilize o implante se tiver qualquer uma das situações mencionadas abaixo:

- Se tem alergia (hipersensibilidade) ao etonogestrel
- Se tem uma trombose. A trombose é a formação de um coágulo de sangue num vaso sanguíneo [por exemplo, nas pernas (trombose venosa profunda) ou nos pulmões (embolismo pulmonar)].
- Se tem ou teve icterícia (pele amarelada), doença do fígado grave (quando o fígado não está a funcionar corretamente) ou um tumor no fígado.
- Se tem (teve) ou se poderá ter cancro da mama ou dos órgãos genitais.
- Se tem qualquer hemorragia vaginal inexplicável